

Vaccination contre les infections invasives à méningocoques

⚠ Risque de non-remboursement

❖ Contexte

Pour les enfants non vaccinés (ou uniquement vaccinés contre le méningocoque C) la HAS recommande :

- Rattrapage vaccinal contre les ACWY en ciblant les enfants jusqu'à 3 ans (2 ans révolus)
- Pour le sérogroupe B : rattrapage vaccinal contre le sérogroupe B en ciblant les enfants de 2 à 5 ans (4 ans révolus)

❖ Message clé à retenir

⚠ Vaccin recommandé ≠ vaccin remboursé (cf. tableau ci-dessous)

Méningo ACWY						
Age	Nimenrix®		Menquadfi®		Menveo®	
	Prescription/ admin par pharmacien	Remb	Prescription/ admin par pharmacien	Remb	Prescription/ admin par pharmacien	Remb
6-12 mois	Non	Oui				
12-24 mois (RV)	Non	Oui	Non	Oui		
2-3 ans	Non	Non	Non	Non		
11-14 ans	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
15-24 ans (RV)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Méningo B						
Age	Bexsero®		Trumenba®		RV = rattrapage vaccinal Remb = remboursement Admin = administration	
	Prescription/ admin par pharmacien	Remb	Prescription/ admin par pharmacien	Remb		
2 mois – 2 ans	Non	Oui	Non	Non		
2-5 ans	Non	Non	Non	Non		
15 – 24 ans	Oui	Oui	Oui	Oui		

Bonnes pratiques à l'officine avant toute délivrance :

- **Vérifier l'âge de l'enfant**
- **Vérifier l'éligibilité au remboursement selon le calendrier vaccinal**
- **Ne pas télétransmettre** si le vaccin n'est pas remboursable - **Attention au risque d'indû**
- **Informer clairement les parents** si le vaccin est **à leur charge** et faire une facture pour prise en charge éventuelle par la Mutuelle
- **Conserver l'ordonnance et la traçabilité de l'information donnée**

❑ Ressources documentaires disponibles :

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://urpspharmaciens-pdl.com/wp-content/uploads/2025/09/synthese-vaccins-meningo-mise-a-jour-ete-2025.docx&ved=2ahUKEwjZyOnfzdORAxV3VKQEHdx-Cf0QFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw3rqJ_bJO-W9R48Wpx3Q43u