



WINREVAIR®

► Sotatercept

À quoi sert ce médicament ?

- Sotatercept WINREVAIR® fait partie de la classe des inhibiteurs de la voie de signalisation de l'activine. Il est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire en association à d'autres traitements
- Prescrit et renouvelé par votre médecin spécialiste en pneumologie, cardiologie ou médecine interne
- Selon l'indication, médicament disponible dans les pharmacies hospitalières ou en pharmacies de ville sur présentation de votre ordonnance.

- Flacon de poudre blanche à blanc cassé, dosé à **45 mg** ou **60 mg**

- Solution limpide à opalescente et incolore à légèrement jaune-brunâtre après reconstitution



► Avant ouverture, conservation au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C), dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière



► **Jetez** les flacons, seringues, aiguilles dans un collecteur dédié



Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	Jour d'injection :h.....	= 1 fois toutes les 3 semaines
Comment ?	- Sortir le kit du réfrigérateur et attendre 15 minutes avant la préparation - Retirer le couvercle du flacon de poudre, nettoyer le bouchon à l'aide d'une lingette alcoolisée puis fixer le dispositif de transfert au flacon - Casser le capuchon de la seringue préremplie d'eau stérile et fixer la seringue au dispositif de transfert. - Injecter toute l'eau stérile dans le flacon, agiter délicatement et laisser reposer 3 minutes - Dévisser la seringue du dispositif de transfert et jeter la seringue vide - Tamponner le dispositif de transfert avec une lingette alcoolisée - Fixer la seringue doseuse au dispositif de transfert, retourner le flacon et prélever le volume approprié à injecter en fonction du poids. Si nécessaire, pousser le piston pour éliminer l'air ou l'excès de liquide - Retirer la seringue du dispositif de transfert et fixer l'aiguille - Tamponner le site d'injection avec une lingette alcoolisée et effectuer un pli de peau au niveau de l'abdomen (à au moins 5 cm du nombril) ou du haut de la cuisse dans une zone non cicatricielle, non sensible et non lésée. - Procéder à l'injection sous cutanée selon un angle de 45° à 90° - Jeter la seringue vide	

- Respectez la dose prescrite par votre médecin
- **En cas d'oubli de 3 jours ou moins** : réalisez l'injection dès que possible puis reprenez votre schéma de traitement initial dès la dose suivante.
- **En cas d'oubli de plus de 3 jours** : réalisez l'injection dès que possible. Un ajustement de votre calendrier d'injection sera nécessaire pour maintenir un intervalle de 3 semaines entre chaque administration.
- N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.



Grossesse et allaitement

► Traitement non recommandé pendant la grossesse et chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 4 mois après la dernière administration.

► Interrompez l'allaitement durant le traitement et jusqu'à 4 mois après la dernière administration.



Quels effets indésirables peuvent survenir avec WINREVAIR® ?

Comme tous les médicaments, WINREVAIR® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
 Augmentation du taux d'hémoglobine	Cela peut augmenter le risque de formation d'un caillot sanguin
 Baisse des plaquettes	Contactez votre médecin en cas de survenue de petits points rouges sur la peau, d'ecchymoses, de saignements de nez, de petites hémorragies oculaires ou gingivales, de présence de sang dans les urines ou les selles.
 Saignements inhabituels, hématomes	Utilisez une brosse à dent souple ; évitez l'utilisation d'un thermomètre rectal. Ne prenez ni aspirine, ni anti-inflammatoire (ex : ibuprofène), ni produits de phytothérapie (pouvant favoriser les saignements) sans avis médical : demandez l'avis d'un professionnel de santé. En cas de survenue d'un bleu, appliquez un objet froid (poche de froid ou sac de glace), voire une crème ou un gel adapté (notamment à base d'arnica) si la peau n'est pas lésée.
 Saignement de nez	Penchez la tête en avant pendant toute la durée du saignement et mouchez-vous jusqu'à évacuation des caillots. Maintenez une pression sur vos narines pendant 10 min ; des produits hémostatiques peuvent réduire ce temps (mèches à appliquer après 2 min de compression et à laisser en place 30 min). En cas d'écoulement persistant au-delà de 15 min de compression ou en cas de pâleur, palpitation, sueurs ou hypotension : consultez immédiatement.
 Diarrhée	Surveillez votre poids. Buvez des boissons sucrées et/ou salées : eau, thé sucré, sodas, potages. Evitez les eaux riches en magnésium (CONTREX®, HEPAR®), le café, les boissons glacées. Privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane) ; évitez les aliments pouvant stimuler le transit intestinal (laitages, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices). Lavez-vous les mains régulièrement. En cas de fièvre associée ou de symptômes persistants au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.
 Maux de tête	Pensez à bien vous hydrater. Mangez à heure régulière, ne sautez pas de repas. Evitez tabac et alcool (déclencheurs de maux de tête). Evitez les couchers tardifs, les grasses matinées ; dormez suffisamment la nuit.

 Seuls certains effets indésirables sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

 Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Saignements inhabituels et/ou importants
- Sang des selles ou dans les vomissements



Fiche remise le :